



جامعة حلب

كلية الطب البشري

# بنك العينية



2019 / 2020



# القرنية

(50) سؤال

لكل سؤال إجابة واحدة فقط



|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - إن عدد طبقات القرنية هو :<br>A. 4 طبقات<br>B. 5 طبقات<br>C. 6 طبقات<br>D. 7 طبقات<br>E. 10 طبقات                                                                               | 6 - العصب المسؤول عن التعصيب الحسي للقرنية هو :<br>A. العصب البكري<br>B. العصب المبعد<br>C. العصب العيني<br>D. العصب الوجهي<br>E. العصب الوجني                                                                |
| 2 - تتألف القرنية من كل ما يلي ما عدا :<br>A. الظهارة<br>B. طبقة بومان<br>C. السدى<br>D. غشاء ديسمييه<br>E. الطبقة الوعائية                                                        | 7 - كل ما يلي صحيح عن القرنية العرطة ما عدا :<br>A. كبر خلقي غير مترقي في حجم القرنية<br>B. لا تتراقق بارتفاع توتر باطن العين<br>C. قد تتراقق مع الساد<br>D. أحادية الجانب<br>E. قد تتراقق مع ضمور في القزحية |
| 3 - واحد مما يلي يغذي القرنية :<br>A. الحوف<br>B. الخلط المائي<br>C. طبقة الدمع<br>D. الشريان الشبكي المركزي<br>E. A + B + C                                                       | 8 - كل ما يلي صحيح عن القرنية العرطة ما عدا :<br>A. قطر القرنية أكبر من 10 ملم<br>B. قد تتراقق مع صغر الحدقة<br>C. ثنائية الجانب<br>D. وراثية جسدية متنحية<br>E. 90% من المصابين ذكور                         |
| 4 - تتصف القرنية بكل ما يلي ما عدا :<br>A. الشفافية<br>B. فرط التوعية<br>C. الكروية<br>D. اللمعان<br>E. الحساسية                                                                   | 9 - كل ما يلي صحيح عن القرنية الصغيرة ما عدا :<br>A. قطر القرنية أقل من 10 ملم<br>B. وراثية جسدية<br>C. تتراقق بحسر بصر<br>D. تتراقق بنسبة مرتفعة من الزرق<br>E. قد تتراقق بالساد                             |
| 5 - كل مما يلي من أسباب شفوفية القرنية ما عدا :<br>A. توازي ألياف نسيجها الخاص<br>B. انتظام ألياف نسيجها الخاص<br>C. رقة الأوعية الدموية فيها<br>D. الإمامة<br>E. عدم وجود الأوعية | 10 - ما يلي صحيح عن تصلب القرنية :<br>A. حالة مترقية<br>B. حالة التهابية<br>C. تفقد القرنية شفافيتها<br>D. أحادية الجانب في 90 % من الحالات<br>E. كل ما سبق صحيح                                              |

|             |    |                |               |               |   |               |               |   |   |   |
|-------------|----|----------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---|---|
| رقم السؤال  | 10 | 9              | 8             | 7             | 6 | 5             | 4             | 3 | 2 | 1 |
| الجواب      | C  | C              | D             | D             | C | C             | B             | E | E | B |
| تصحيح الخطأ |    | تترافق بمد بصر | مرتبطة بالجنس | ثنائية الجانب |   | لا يوجد توعية | لا يوجد توعية |   |   |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>11 - كل ما يلي صحيح عن حثل الاندوثيليوم الوراثي الولادي في القرنية ما عدا :</b></p> <p>A. القرنية بيضاء مزرقة</p> <p>B. حالة إحادية الجانب</p> <p>C. الوراثة جسدية</p> <p>D. تترافق بوذمة في القرنية</p> <p>E. تترافق برأرة أحيانا</p>            | <p><b>16 - من الجراثيم المسببة لالتهاب القرنية الجرثومي :</b></p> <p>A. المكورات العنقودية</p> <p>B. المكورات العقدية</p> <p>C. المكوات الرئوية</p> <p>D. الموراكسيلا</p> <p>E. كل ما سبق صحيح</p>                                                                             |
| <p><b>12 - كل ما يلي عن القوس الشخية في القرنية صحيح ما عدا :</b></p> <p>A. أكثر تنكسات القرنية شيوعا</p> <p>B. يظهر في القسم العلوي للحواف</p> <p>C. يصيب الرجال أكثر من النساء</p> <p>D. يسبب تدني شديد بحدة الرؤية</p> <p>E. الوراثة جسدية سائدة</p> | <p><b>17 - كل مما يلي من مؤهبات الإصابة بالتهاب القرنية الجرثومي ما عدا :</b></p> <p>A. وجود سحجة في سطح القرنية</p> <p>B. وجود التهاب ملتحمة</p> <p>C. وجود التهاب لوزات</p> <p>D. وجود التهاب في الأجفان</p> <p>E. وجود كيس دمع متقيح</p>                                    |
| <p><b>13 - كل ما يلي عن القرنية المخروطية صحيح ما عدا :</b></p> <p>A. استحالة وراثية ولادية</p> <p>B. تمدد مخروطي مترقى في القرنية</p> <p>C. تسمك في المركز على حساب اللحمية</p> <p>D. ثنائية الجانب غالبا</p> <p>E. تظهر الأعراض في سن البلوغ</p>      | <p><b>18 - تزداد نسبة مشاهدة القرحات القرنية عند كل ما يلي ما عدا :</b></p> <p>A. مستعملي النظارات الطبية</p> <p>B. مستعملي العدسات اللاصقة</p> <p>C. الاستعمال المديد للصادات</p> <p>D. الاستعمال المديد للمستيروييدات القشرية</p> <p>E. الاستعمال المديد لمثبطات المناعة</p> |
| <p><b>14 - كل ما يلي عن القرنية المخروطية صحيح ما عدا :</b></p> <p>A. تسبب مد بصر شديد</p> <p>B. تسبب لابؤرية</p> <p>C. قد تظهر ندوب في القرنية</p> <p>D. قد تسبب حرج بصر غير منتظم</p> <p>E. تسبب تدني في حدة الرؤية</p>                               | <p><b>19 - من الأعراض والعلامات المشاهدة في التهاب القرنية الجرثومي ما يلي ما عدا :</b></p> <p>A. الألم</p> <p>B. الدماغ</p> <p>C. رؤية هالات</p> <p>D. رأرة</p> <p>E. الشعور بجسم أجنبي</p>                                                                                   |
| <p><b>15 - كل ما يلي صحيح في علاج القرنية المخروطية ما عدا :</b></p> <p>A. النظارات الطبية</p> <p>B. تصحيح أسوء الانكسار</p> <p>C. العدسات اللاصقة</p> <p>D. الستيروييدات القشرية</p> <p>E. رأب القرنية الثاقب</p>                                      | <p><b>20 - من صفات القرحة في التهاب القرنية الجرثومي ما يلي ما عدا :</b></p> <p>A. شكل مدور أو بيضوي</p> <p>B. حواف منتظمة</p> <p>C. يتوضع الجرثوم في حوافها</p> <p>D. تتوضع في مركز القرنية</p> <p>E. قد تتوضع في المحيط</p>                                                  |

| رقم السؤال  | 20              | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14          | 13             | 12 | 11            |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|-------------|----------------|----|---------------|
| الجواب      | B               | D  | A  | C  | E  | D  | A           | C              | D  | B             |
| تصحيح الخطأ | حواف غير منتظمة |    |    |    |    |    | حسر وليس مد | ترقق وليس تسمك |    | ثنائية الجانب |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>21 - من اختلاطات القرحة القرنية مايلي عدا :</b></p> <p>A. الانتقاب وخروج الخلط المائي</p> <p>B. التهاب الأجسام الهدبية</p> <p>C. التهاب العين الشامل</p> <p>D. الزرق الأولي</p> <p>E. النزف داخل العين</p>       | <p><b>26 - يتصف التهاب القرنية المتغصن الحلأئي بكل ما يلي ما عدا :</b></p> <p>A. دماغ</p> <p>B. خوف من الضياء</p> <p>C. ثنائي الجانب غالبا</p> <p>D. كثير النكس</p> <p>E. قد يترافق بالتهاب قزحية</p>                                                                                                                  |
| <p><b>22 - ما يلي يساعد في تشخيص القرحة القرنية الجرثومية :</b></p> <p>A. تصوير الأوعية الظليل</p> <p>B. ال MRI</p> <p>C. تلوين القرحة بالفلورسيتين</p> <p>D. أخذ مسحة من مركز القرحة</p> <p>E. فحص حدة البصر</p>      | <p><b>27 - إن سبب زيادة مصادفة التهاب القرنية الحلأئي الجغرافي هو :</b></p> <p>A. الاستخدام العشوائي للصادات</p> <p>B. التدخين</p> <p>C. تعاطي الكحول</p> <p>D. الاستعمال العشوائي للكورتيكوستيرويدات</p> <p>E. السفر لمناطق موبوءة</p>                                                                                |
| <p><b>23 - كل ما يلي يستخدم في تدبير القرحة القرنية الجرثومية ما عدا :</b></p> <p>A. الصادات واسعة الطيف</p> <p>B. الأسيكلوفير</p> <p>C. العدسات اللاصقة الطرية</p> <p>D. اللاصق الحيوي</p> <p>E. مسكنات الألم</p>     | <p><b>28 - كل ما يلي يستخدم في تدبير التهاب القرنية الحلأئي ما عدا :</b></p> <p>A. الأسيكلوفير</p> <p>B. الإيدوكسيوريدين</p> <p>C. الكورتيكوستيرويدات</p> <p>D. موسعات الحدقة في حال ترافقه بالتهاب قزحية</p> <p>E. صادات في حال الإنتان الثانوي</p>                                                                   |
| <p><b>24 - أشيع الحمات الراشحة التي تسبب التهاب القرنية هي :</b></p> <p>A. الحلأ البسيط</p> <p>B. الحلأ النطاقي</p> <p>C. الروتافيروس</p> <p>D. الأدينوفيروس</p> <p>E. A + B</p>                                       | <p><b>29 - كل مايلي صحيح عن داء المنطقة العيني ما عدا :</b></p> <p>A. ألم شديد على مسار العصب مثلث التوائم</p> <p>B. حويصلات تتجاوز الخط المتوسط لتمتد للجهة المقابلة</p> <p>C. تترك الحويصلات بقعا ضمورية على الجلد</p> <p>D. تسبب ندبا ضمورية في القزحية مع فقد الحس فيها</p> <p>E. تشفى الإصابة خلال سنة أسابيع</p> |
| <p><b>25 - يتصف التهاب القرنية بالعقوبل البسيط بكل ما يلي ما عدا :</b></p> <p>A. يلي أمراضا مضعفة للمناعة</p> <p>B. وحيد الجانب غالبا</p> <p>C. يترافق بنقص حس القرنية</p> <p>D. سرعة الشفاء</p> <p>E. الميل للنكس</p> | <p><b>30 - كل ما يلي يستخدم في علاج داء المنطقة العيني ما عدا :</b></p> <p>A. مسكنات بالطريق العام</p> <p>B. مطهرات موضعية</p> <p>C. كورتيكوستيرويدات</p> <p>D. الغاماغلوبولين</p> <p>E. الأسيكلوفير</p>                                                                                                               |

| رقم السؤال  | 30 | 29                     | 28 | 27 | 26            | 25         | 24 | 23 | 22 | 21            |
|-------------|----|------------------------|----|----|---------------|------------|----|----|----|---------------|
| الجواب      | C  | D                      | C  | D  | C             | D          | E  | B  | C  | D             |
| تصحيح الخطأ |    | لا تتجاوز الخط المتوسط |    |    | أحادية الجانب | بطء الشفاء |    |    |    | الزرق الثانوي |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>31 - ما يلي يستخدم في علاج التهابات القرنية الفطرية :</b></p> <p>A. الجنتاميسين</p> <p>B. الأسيكلوفير</p> <p>C. الريفامبيسيم</p> <p>D. الأمفوتريسين B</p> <p>E. البريدنيزولون</p>                                                                                | <p><b>36 - العرض الرئيسي في التهاب القرنية الخلالي الزهري هو :</b></p> <p>A. الزرق الثانوي</p> <p>B. الكثافات القرنية</p> <p>C. تدني حدة البصر</p> <p>D. الارتشاح العكر</p> <p>E. الحول الأنسي</p>                                                     |
| <p><b>32 - كل ما يلي من أعراض التهاب القرنية الأرجي ما عدا :</b></p> <p>A. ألم شديد</p> <p>B. خوف من الضياء</p> <p>C. زرق أولي</p> <p>D. تشنج في الأجفان</p> <p>E. تشوش في الرؤية</p>                                                                                  | <p><b>37 - إصابة العصب التالي يسبب التهاب القرنية التغذوي العصبي :</b></p> <p>A. العصب الثالث</p> <p>B. العصب الرابع</p> <p>C. العصب الخامس</p> <p>D. العصب السادس</p> <p>E. العصب السابع</p>                                                          |
| <p><b>33 - كل ما يلي صحيح عن التهاب القرنية الخلالي الزهري ما عدا:</b></p> <p>A. أصبح نادر المشاهدة</p> <p>B. يصيب العينين تباعا</p> <p>C. تصاب العين الثانية بعد إصابة الأولى بعدة أسابيع</p> <p>D. العرض الرئيسي هو الزرق الثانوي</p> <p>E. قد تحدث كثافات قرنية</p> | <p><b>38 - إصابة العصب التالي يسبب التهاب القرنية التعرضي (عين الأرنب) :</b></p> <p>A. العصب الثالث</p> <p>B. العصب الرابع</p> <p>C. العصب الخامس</p> <p>D. العصب السادس</p> <p>E. العصب السابع</p>                                                    |
| <p><b>34 - تشاهد حلقة كايزر - فليشر عند المرضى المصابين ب :</b></p> <p>A. الزهري</p> <p>B. الإيدز</p> <p>C. داء ويلسون</p> <p>D. عوز فيتامينA</p> <p>E. الحلا النطاقي</p>                                                                                              | <p><b>39 - ظهور تقبب على شكل حويصل أسود في قعر القرحة القرنية الجرثومية يدل على :</b></p> <p>A. بداية ظهور القرحة</p> <p>B. مرحلة شفاء القرحة</p> <p>C. غزارة الجراثيم في القرحة</p> <p>D. تقبب غشاء ديسميخ وخطر انتقابه</p> <p>E. ليس له أي دلالة</p> |
| <p><b>35 - كل ما يلي صحيح عن حلقة كايزر - فليشر ما عدا :</b></p> <p>A. تشاهد عند المصابين بداء ويلسون</p> <p>B. تتكون من ترسبات من النحاس</p> <p>C. لا تظهر عند جميع المصابين بداء ويلسون</p> <p>D. تسبب تدني القدرة البصرية</p> <p>E. تفيد في تشخيص فرط النحاس</p>    | <p><b>40 - أكثر تنكسات القرنية شيوعا هو :</b></p> <p>A. القرنية العرطلة</p> <p>B. القوس الشيخية</p> <p>C. القرنية المخروطية</p> <p>D. حثل الاندوتيليوم الوراثي</p> <p>E. تصلب القرنية</p>                                                              |

| رقم السؤال  | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33                              | 32 | 31 |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------------|----|----|
| الجواب      | B  | D  | E  | C  | D  | D  | C  | D                               | C  | D  |
| تصحيح الخطأ |    |    |    |    |    |    |    | العرض الرئيسي هو الارتشاح العكر |    |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>41 - تشكل القرنية من سطح غلاف كرة العين الليفي :</b></p> <p>A. النصف الأمامي</p> <p>B. الثلث الأمامي</p> <p>C. الربع الأمامي</p> <p>D. الخمس الأمامي</p> <p>E. السدس الأمامي</p>                                                                            | <p><b>46 - كل ما يلي صحيح عن التهابات القرنية الفطرية ما عدا :</b></p> <p>A. تحدث بعد دخول الفطر من خلال سحجة في القرنية</p> <p>B. تظهر القرحة كزر أبيض ناتئ</p> <p>C. تكون القرنية ذات منظر رمادي</p> <p>D. تترافق غالباً بانصباب رائق</p> <p>E. إنذارها سيء</p> |
| <p><b>42 - كل ما يلي من الشذوذات الولادية في القرنية ما عدا :</b></p> <p>A. القرنية العرطلة</p> <p>B. القرنية الصغيرة</p> <p>C. القرنية المخروطية</p> <p>D. القوس الشخية</p> <p>E. تصلب القرنية</p>                                                               | <p><b>47 - واحد مما يلي من اختلاطات التهاب القرنية الخلالي الزهري :</b></p> <p>A. الكثافات القرنية و الزرق الثانوي</p> <p>B. القرنية العرطلة</p> <p>C. الزرق الأولي</p> <p>D. القرنية المخروطية</p> <p>E. الحول ثنائي الجانب</p>                                  |
| <p><b>43 - يكون توتر باطن العين في القرنية العرطلة :</b></p> <p>A. مرتفع</p> <p>B. منخفض</p> <p>C. طبيعي</p> <p>D. مرتفع جداً</p> <p>E. منخفض جداً</p>                                                                                                            | <p><b>48 - أحد الاضطرابات التالية يسبب حسر بصر شديد :</b></p> <p>A. القرنية الصغيرة</p> <p>B. القرنية المخروطية</p> <p>C. القوس الشخية</p> <p>D. تصلب القرنية</p> <p>E. كل ما سبق خطأ</p>                                                                         |
| <p><b>44 - إن التهاب القرنية التغصني هو نوع من التهاب القرنية :</b></p> <p>A. الحائي</p> <p>B. الأرجي</p> <p>C. الجرثومي</p> <p>D. الفطري</p> <p>E. التعرضي</p>                                                                                                   | <p><b>49 - يشاهد مد بصر في :</b></p> <p>A. القرنية الصغيرة</p> <p>B. القرنية المخروطية</p> <p>C. القوس الشخية</p> <p>D. القرنية العرطلة</p> <p>E. كل ما سبق خطأ</p>                                                                                               |
| <p><b>45 - كل ما يلي من صفات الألم في داء المنطقة العيني ما عدا :</b></p> <p>A. ألم خفيف</p> <p>B. يتوضع على مسار العصب مثلث التوائم</p> <p>C. يزول بزوال الحويصلات</p> <p>D. قد يستمر لفترة طويلة بعد الشفاء</p> <p>E. تقيد المسكنات بالطريق العام في تدبيره</p> | <p><b>50 - كل الحالات التالية تميل لأن تكون ثنائية الجانب ما عدا :</b></p> <p>A. تصلب القرنية</p> <p>B. القرنية المخروطية</p> <p>C. حثل الإندوثيليوم الوراثي الولادي</p> <p>D. التهاب القرنية المتغصن الحائي</p> <p>E. القرنية العرطلة</p>                        |


|             |    |    |    |    |             |      |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|-------------|------|----|----|----|----|
| رقم السؤال  | 50 | 49 | 48 | 47 | 46          | 45   | 44 | 43 | 42 | 41 |
| الجواب      | D  | A  | B  | A  | D           | A    | A  | C  | D  | E  |
| تصحيح الخطأ |    |    |    |    | انصباب قيحي | شديد |    |    |    |    |



# الصلبة

(15) سؤال

لكل سؤال إجابة واحدة فقط



|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1- تبلغ ثخانة الصلبة :</b></p> <p>A. 1 ملم.</p> <p>B. 2 ملم.</p> <p>C. 3 ملم.</p> <p>D. 4 ملم.</p> <p>E. 5 ملم.</p>                                                               | <p><b>6- عين البقر تنتج عن:</b></p> <p>A. ترقق جدار الصلبة.</p> <p>B. تسمك جدار الصلبة.</p> <p>C. تمطط ألياف الصلبة.</p> <p>D. زيادة الياف الكولاجين في الصلبة.</p> <p>E. رؤية القميص العضلي الوعائي عبر الصلبة.</p>      |
| <p><b>2- تشكل الصلبة حوالي:</b></p> <p>A. 6/5.</p> <p>B. 6/1.</p> <p>C. 6/4.</p> <p>D. 6/3.</p> <p>E. 6/2.</p>                                                                          | <p><b>7-من الإصابات الولادية للصلبة:</b></p> <p>A. عين البقر.</p> <p>B. الصلبة الزرقاء.</p> <p>C. حسر البصر الشديد.</p> <p>D. A+B.</p> <p>E. كل ما سبق صحيح.</p>                                                          |
| <p><b>3- يجاور الصلبة من الأمام:</b></p> <p>A. القرنية.</p> <p>B. القرحية.</p> <p>C. الملتحمة.</p> <p>D. عضلات العين الخارجية.</p> <p>E. كل ما سبق خطأ.</p>                             | <p><b>8- في ال episcleritis:</b></p> <p>A. يحدث قرب الحوف غالباً.</p> <p>B. يمكن رؤيته بالمصباح الشقي.</p> <p>C. قد يكون من تحسسي.</p> <p>D. عرضة للنكس.</p> <p>E. كل ما سبق صحيح.</p>                                    |
| <p><b>4- الصلبة الزرقاء تنتج عن:</b></p> <p>A. الاحتقان الوريدي.</p> <p>B. مرض الزرق.</p> <p>C. ترقق جدار الصلبة.</p> <p>D. ازدياد ترسب الياف الكولاجين.</p> <p>E. مد البصر الشيخي.</p> | <p><b>9-التهاب صلبة وتينون يعتبر من:</b></p> <p>A. التهاب الصلبة الأمامي.</p> <p>B. التهاب الصلبة الخلفي.</p> <p>C. التهاب ما حول الصلبة أمامي.</p> <p>D. التهاب ما حول الصلبة الخلفي.</p> <p>E. كل ما سبق خطأ.</p>       |
| <p><b>5- تشاهد الصلبة الزرقاء:</b></p> <p>A. مرض اهلر دانوس.</p> <p>B. مرض لوبشتاين.</p> <p>C. تناذر مارفان.</p> <p>D. A+C.</p> <p>E. كل ما سبق صحيح.</p>                               | <p><b>10-في ترقق الصلبة الثاقب: (اختر الخاطئة)</b></p> <p>A. مؤلم.</p> <p>B. غير مؤلم.</p> <p>C. لا يترافق مع علامات التهابية.</p> <p>D. يترافق مع أمراض الكولاجين.</p> <p>E. يمكن رؤية القميص العضلي من خلال الثقوب.</p> |

| رقم السؤال  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10       |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| الجواب      | A | A | C | C | E | C | E | E | B | A        |
| تصحيح الخطأ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | غير مؤلم |


|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>11- البقع الزجاجية تؤدي الى:</b></p> <p>A. مد بصر.<br/>B. قصر بصر.<br/>C. حرج البصر.<br/>D. مد البصر الشخي.<br/>E. كل ما سبق خطأ.</p>                                              | <p><b>14- الغرن الليفي fibrosarcoma هو:</b></p> <p>A. ورم خبيث.<br/>B. قليل الانتشار نحو الأعضاء الأخرى.<br/>C. سريع الانتشار نحو الأعضاء المجاورة.<br/>D. A+B.<br/>E. A+C.</p> |
| <p><b>12- العنبات الأمامية تتوضع:</b></p> <p>A. قرب الحوف.<br/>B. قرب الجسم الهدبي.<br/>C. قرب القزحية.<br/>D. قرب الشبكية.<br/>E. قرب العقدة الهدبية.</p>                               | <p><b>15- يشاهد الوعاؤوم الدموي في:</b></p> <p>A. تنانير ستورج ويبر.<br/>B. الورم العصبي الليفي.<br/>C. ورم غمد شوان.<br/>D. مرض ركلنهاوزن.<br/>E. كل ما سبق صحيح.</p>          |
| <p><b>13- العنبات الخلفية تتوضع:</b></p> <p>A. إلى الوحشي من الحليمة.<br/>B. إلى الأنسي من الحليمة.<br/>C. أعلى الحليمة.<br/>D. أسفل الحليمة.<br/>E. في مناطق دخول الأوردة الشلالية.</p> |                                                                                                                                                                                 |

|             |    |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|----|
| رقم السؤال  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| الجواب      | C  | A  | A  | D  | E  |
| تصحيح الخطأ |    |    |    |    |    |

# العصب البصري

(35) سؤال

لكل سؤال إجابة واحدة فقط



|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- يتضمن الطريق البصري كل ما يلي عدا :<br>A. العصب البصري<br>B. التصالب البصري<br>C. السبيل البصري<br>D. الأجسام الركبية الأنسية<br>E. الشع البصري والمركز العصبي                                                                                                                             | 6- كل مما يلي خطأ ما عدا :<br>A. طول العصب البصري 44-45 سم<br>B. الجزء الأطول هو الجزء داخل العين<br>C. غير محاط بالسحايا<br>D. الجزء الأطول هو داخل الحجاج<br>E. الألياف القادمة من النصف الأنسي للشبكية لا تتصالب                                                                                                                                                                                  |
| 2- يتصف العصب البصري بكل ما يلي عدا :<br>A. هو الزوج القحفي الثاني<br>B. يتكون من محاور الخلايا البصرية في الشبكية<br>C. يأخذ شكل حرف S في الحجاج<br>D. يتعرض للانضغاط أثناء مروره عبر النفق البصري<br>E. يتعرض للانضغاط أثناء المرور عبر الصفيحة المثقبة                                     | 7- يتعرض العصب البصري لكل مما يلي عدا :<br>A. الانضغاط عند مروره عبر الصفيحة المثقبة<br>B. الانضغاط عند مروره عبر النفق البصري<br>C. الانتانات المنتقلة من الخلايا الغربالية في التهابات الجيوب<br>D. لا يتأثر بأورام الجيوب<br>E. كل ما سبق خطأ                                                                                                                                                     |
| 3- يتصف العصب البصري بكل مما يلي عدا :<br>A. قد يتعرض للإنتنانات المنتقلة من الخلايا الغربالية في التهاب الجيوب<br>B. طوله الوسطي 44-45 ملم<br>C. محاط بثلاثة أغمده هي امتداد مباشر للسحايا<br>D. أطول جزء منه هو الجزء داخل النفق البصري<br>E. كل ما سبق خطأ                                 | 8- فيما يتعلق بالتصالب البصري ( اختر الخطأ ) :<br>A. الألياف غير المصالبة هي الاتية من النصف الصدغي للشبكية<br>B. الألياف المصالبة هي الاتية من النصف الأنسي للشبكية<br>C. الإصابة على مستوى التصالب تسبب عمى نصفي أنسي ثنائي الجانب<br>D. يتشكل السبيل البصري الأيمن من الألياف الاتية من النصف الصدغي لشبكية العين اليمنى و الألياف الاتية من النصف الأنسي لشبكية العين اليسرى<br>E. كل ما سبق خطأ |
| 4- أطول أجزاء العصب البصري هو :<br>A. الجزء داخل العين<br>B. الجزء داخل الحجاج<br>C. الجزء داخل النفق البصري<br>D. الجزء داخل القحف<br>E. كل ما سبق خطأ                                                                                                                                       | 9- فيما يتعلق بالطريق البصري كل مما يلي صحيح عدا :<br>A. يبدأ من العصب البصري<br>B. ينقسم التصالب البصري الى الياف مصالبة وأخرى غير مصالبة<br>C. الالياف غير المصالبة اتية من النصف الصدغي للشبكية<br>D. الالياف المصالبة اتية من النصف الوحشي للشبكية<br>E. ينتهي السبيل البصري في الاجسام الركبية الوحشية                                                                                          |
| 5- كل ما يلي صحيح ما عدا :<br>A. العصب البصري يتكون من محاور الخلايا العقدية في الشبكية<br>B. محاور الخلايا العقدية تتجمع في حلزمة العصب البصري بشكل حزم متصلة<br>C. أهم الحزم التي تمر عبر حلزمة العصب البصري هي الاتية من اللطخة الصفراء<br>D. يأخذ شكل حرف S في الحجاج<br>E. كل ما سبق خطأ | 10- تلامه العصب البصري كل ما يلي صحيح عدا :<br>A. من الشذوذات الولادية في حلزمة العصب البصري<br>B. مرتبطة بعدم انغلاق الشق الجنيني<br>C. أو انغلاقه الجزئي<br>D. في الانغلاق الجزئي يظهر العرف السفلي ويكون شاحبا<br>E. لا يترافق باللابؤرية و مد البصر                                                                                                                                              |

|             |         |         |             |   |        |   |   |      |        |        |
|-------------|---------|---------|-------------|---|--------|---|---|------|--------|--------|
| رقم السؤال  | 1       | 2       | 3           | 4 | 5      | 6 | 7 | 8    | 9      | 10     |
| الجواب      | D       | B       | D           | B | B      | D | D | C    | D      | E      |
| تصحيح الخطأ | الوحشية | العقدية | داخل الحجاج |   | منفصلة |   |   | صدغي | الأنسي | يترافق |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>11- بقاء غمد النخاعين في حلزمة العصب البصري :</b></p> <p>A. قد يسبب العمى</p> <p>B. لا يمتد للشبكية</p> <p>C. لا يؤثر في القدرة البصرية</p> <p>D. لا يؤدي الى اتساع البقعة العمياء</p> <p>E. كل ما سبق خطأ</p>                                                 | <p>16- يتضمن التشخيص التفريقي لالتهاب حلزمة العصب البصري كل ما يلي عدا :</p> <p>A. اقفار في حلزمة العصب البصري</p> <p>B. الوذمة الركودية في العصب البصري</p> <p>C. التهاب العصب البصري الكاذب</p> <p>D. التهاب العصب البصري خلف المقلة</p> <p>E. كل ما سبق خطأ</p>                                                                                                                              |
| <p>12- من أسباب التهاب العصب البصري :</p> <p>A. Multiple myeloma</p> <p>B. Multiple sclerosis</p> <p>C. Multiple lymphoma</p> <p>D. كل ما سبق خطأ</p> <p>E. كل ما سبق صح</p>                                                                                         | <p>17- من تظاهرات التهاب العصب البصري خلف المقلة :</p> <p>A. نقص شديد للرؤية يتطور بسرعة</p> <p>B. توذم في الحلزمة ينتظر قعر العين</p> <p>C. تضيق الساحة البصرية المحيطي خاصة اللونين الأحمر و الأخضر</p> <p>D. لا يحدث ألم بتحريك المقلة</p> <p>E. كل ما سبق خطأ</p>                                                                                                                           |
| <p>13- من أسباب التهاب حلزمة العصب البصري كل مما يلي عدا :</p> <p>A. أمراض الأذن و الأنف والحنجرة</p> <p>B. الأمراض الالتهابية في الدماغ والسحايا</p> <p>C. بقاء غمد النخاعين</p> <p>D. نقص التروية الدموية</p> <p>E. تصلب المتعدد</p>                               | <p>18- تتضمن أسباب التهاب العصب البصري خلف المقلة :</p> <p>A. التهاب السحايا</p> <p>B. تصلب المتعدد</p> <p>C. داء ليبير</p> <p>D. كل ما سبق صح</p> <p>E. كل ما سبق خطأ</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>14- التهاب حلزمة العصب البصري كل ما يلي صح عدا :</p> <p>A. غالبا ثنائي الجانب</p> <p>B. يشكو المصاب من نقص شديد في الرؤية يتطور بسرعة</p> <p>C. قد يكون السبب التهاب دماغ وسحايا</p> <p>D. ألم بتحريك المقلة</p> <p>E. ينتظر قعر العين حواف الحلزمة غير واضحة</p> | <p>19- فيما يخص التهاب العصب البصري بتأثير المواد السامة كل ما يلي صح عدا :</p> <p>A. قد يحدث بسبب بعض المواد كالديجيتال و السلفوناميدات</p> <p>B. تتخفف القدرة الابصارية بشدة وبسرعة</p> <p>C. حلزمة العصب البصري مفرطة التبيغ وقد تحدث وذمة فيها</p> <p>D. العلاج هو إيقاف تناول هذه المواد و إعطاء الكورتيكوستيروئيدات</p> <p>E. الإنذار جيد بعد إيقاف هذه المواد حتى في الحالات الشديدة</p> |
| <p>15- ينتظر قعر العين في التهاب حلزمة العصب البصري نرى :</p> <p>A. نزوف ضمن الجسم الزجاجي</p> <p>B. وجود تغير فيزيولوجي للحلزمة</p> <p>C. حواف الحلزمة واضحة</p> <p>D. فرط تبيغ الحلزمة و احتقان اوردها</p> <p>E. كل ما سبق صح</p>                                  | <p>20- من أسباب الوذمة الركودية في العصب البصري كل ما يلي عدا :</p> <p>A. أورام الدماغ</p> <p>B. رضوض الجمجمة</p> <p>C. التهاب العصب البصري بتأثير المواد السامة</p> <p>D. أمهات الدم في الدماغ</p> <p>E. أمراض الكبد و الدم</p>                                                                                                                                                                |

| رقم السؤال  | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 | 16 | 17 | 18 | 19   | 20 |
|-------------|----|----|----|--------------|----|----|----|----|------|----|
| الجواب      | C  | B  | C  | A            | D  | D  | C  | D  | E    | C  |
| تصحيح الخطأ |    |    |    | أحادي الجانب |    |    |    |    | سبعة |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21- العرض الأكثر شيوعا في الوذمة الركودية في العصب البصري :<br>A. تشوش الرؤية<br>B. الألم عند تحريك المقلة<br>C. الصداع<br>D. A و B<br>E. A و C                                                                                                                                                                                                                          | 26- في فحص قعر العين عند مريض مصاب بضمور العصب البصري:<br>A. شحوب حلزمة العصب البصري و تضيق او عيتها الشديد<br>B. عند وصول الضمور الى ذروته تصبح الحلزمة بيضاء مائلة للرمادي أو الزرقة<br>C. يقل فيها عدد الأوعية الدموية<br>D. كل ما سبق صحيح<br>E. كل ما سبق خطأ                                                        |
| 22- فيما يخص الوذمة الركودية في العصب البصري كل ما يلي صح عدا :<br>A. تبقى القدرة الابصارية دون تبدل لمدة طويلة قبل ظهور ضمور العصب البصري<br>B. غالبا ما تكون ثنائية الجانب<br>C. بفحص حلزمة العصب البصري تكون متوذمة متضخمة متباززة للأمام<br>D. لا تعود صورة قعر العين للطبيعي بعد العلاج و إزالة المسبب باكرا<br>E. ممكن ان نجد علامات و اعراض عصبية مرافقة لها      | 27- ضمور ليبر :<br>A. هو شكل خاص من أشكال ضمور العصب البصري البدئي<br>B. مرض وراثي مرتبط بالجنس<br>C. يصيب الذكور عادة في عمر 13-28 سنة و تندر إصابة الفتيات<br>D. تدن في القدرة البصرية في العينين خلال بضعة أيام و تكون حالة المريض حسنة<br>E. كل ما سبق صحيح                                                           |
| 23- التهاب العصب البصري الاقvari كل ما يلي صح عدا :<br>A. السبب اضطراب الدوران الدموي في الأوعية المغذية للعصب البصري<br>B. يحدث لدى المرضى بأعمار 45 – 65 سنة<br>C. يتميز بالبء التدريجي خاصة لدى مرضى فرط التوتر الشرياني و تصلب الشرايين<br>D. يظهر مرتبطا بالتهاب الشرايين كالتهاب الشريان الصدغي<br>E. العلاج موسعات الأوعية و الفيتامينات و الإنذار سيء رغم العلاج | 28- الضمور البدئي البسيط في العصب البصري كل ما يلي صحيح عدا :<br>A. يشاهد بكثرة في الزهري<br>B. يترافق بتضيق الساحة البصرية خاصة للونين الأحمر و الأخضر<br>C. عادة أحادي الجانب<br>D. يصادف لدى مرضى أواسط العمر<br>E. من المميز عدم تفاعل الحدقتين و شكلهما غير المنتظم                                                  |
| 24- يظهر فحص قعر العين عند مريض التهاب العصب البصري الاقvari كل ما يلي عدا :<br>A. تؤذم حلزمة العصب البصري<br>B. شحوب الحلزمة<br>C. تضيق لمعة الشرايين و عدم انتظامها<br>D. عتمة نصفية علوية او سفلية<br>E. عدم وجود نزوف                                                                                                                                                | 29- الأجسام الهيلينية في حلزمة العصب البصري ( البراريق) كل ما يلي صحيح عدا :<br>A. كتل مكورة صفراء رمادية شاحبة<br>B. مركبة من مادة الهياالين<br>C. تنشأ بسبب التبدلات الالتهابية التي تصيب ألياف العصب البصري السطحية<br>D. لا تتأثر القدرة البصرية ولا الساحة البصرية<br>E. التشخيص التفريقي عن وذمة حلزمة العصب البصري |
| 25- أسباب ضمور العصب البصري :<br>A. الالتهاب او الوذمة في الياف العصب البصري<br>B. أورام الجملة العصبية المركزية<br>C. التهاب الدماغ<br>D. التصلب المتعدد<br>E. كل ما سبق صحيح                                                                                                                                                                                           | 30- من أشكال التهاب العصب البصري كل ما يلي عدا :<br>A. التهاب حلزمة العصب البصري<br>B. التهاب العصب البصري خلف المقلة<br>C. التهاب العصب البصري امام المقلة<br>D. التهاب العصب البصري بنقص التروية<br>E. كل ما سبق صحيح                                                                                                   |

|             |    |      |       |      |    |    |    |    |         |    |
|-------------|----|------|-------|------|----|----|----|----|---------|----|
| رقم السؤال  | 21 | 22   | 23    | 24   | 25 | 26 | 27 | 28 | 29      | 30 |
| الجواب      | C  | D    | C     | E    | E  | D  | E  | C  | C       | C  |
| تصحيح الخطأ |    | تعود | مفاجئ | وجود |    |    |    |    | التكسية |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>31- الورم الدبقي في العصب البصري كل ما يلي صحيح عدا :</b></p> <p>A. ينشأ على حساب الجزء الدبقي من نسيج العصب البصري</p> <p>B. ينمو ببطء حتى يصبح بحجم اللوزة أو البيضة</p> <p>C. يخترق غلاف العصب البصري السحائي ويعطي انتقالات</p> <p>D. يمكن أن يؤدي للعمى أو الموت</p> <p>E. يظهر غالبا في الطفولة الباكرة رغم أنه يمكن أن يصيب الكبار</p> | <p><b>34- الورم السحائي في العصب البصري :</b></p> <p>A. يتطور على حساب النسيج البشري المتوضع بين الام الجافية والعنكبوتية</p> <p>B. يمكن أن يمتد الى جذع العصب البصري</p> <p>C. يمكن أن يمتد خارج العصب البصري في الحجاج</p> <p>D. كل ما سبق صحيح</p> <p>E. كل ما سبق خطأ</p> |
| <p><b>32- من علامات الورم الدبقي في العصب البصري :</b></p> <p>A. تشوش رؤية</p> <p>B. تبدلات في الساحة البصرية</p> <p>C. جحوظ كرة العين الأمامي الذي يزداد تدريجيا</p> <p>D. كل ما سبق صحيح</p> <p>E. كل ما سبق خطأ</p>                                                                                                                              | <p><b>35- من الأمراض الوراثية التي تصيب العصب البصري :</b></p> <p>A. بقاء غمد النخاعين</p> <p>B. ثلامة حلزمة العصب البصري</p> <p>C. داء ليبير</p> <p>D. كل ما سبق صحيح</p> <p>E. كل ما سبق خطأ</p>                                                                            |
| <p><b>33- فيما يخص الورم الدبقي في العصب البصري كل ما يلي صحيح عدا :</b></p> <p>A. يشبه الورم الدبقي في الدماغ من حيث المظهر</p> <p>B. يظهر تنظير قاع العين وذمة ركودية في العصب البصري</p> <p>C. عادة هذه الوذمة ثنائية الجانب</p> <p>D. الإنذار جيد عند الأطفال وسيء عند الشباب</p> <p>E. العلاج جراحي</p>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |


|             |             |    |        |    |    |
|-------------|-------------|----|--------|----|----|
| رقم السؤال  | 31          | 32 | 33     | 34 | 35 |
| الجواب      | C           | D  | C      | D  | C  |
| تصحيح الخطأ | لا<br>يخترق |    | أحادية |    |    |



# الحجاج

(50) سؤال

لكل سؤال إجابة واحدة فقط



|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 - يتألف الجدار الأنسي للحجاج من كل مما يلي ما عدا :</p> <p>A. الصفيحة الورقية للعظم الغربالي</p> <p>B. العظم الوندي</p> <p>C. العظم الدمعي</p> <p>D. العظم الوجني</p> <p>E. العظم الفكّي</p>                                                                              | <p>6 - كل مما يلي عن الجحوظ الغازي صحيح ما عدا :</p> <p>A. ينجم عن كسر في الجدار الوحشي للحجاج</p> <p>B. يترافق بانتباج بالأجفان</p> <p>C. يزداد الجحوظ إذا أكثر المريض من إخراج الهواء من الأنف بعنف ( النف )</p> <p>D. لا يحتاج هذا النوع من الجحوظ أي علاج</p> <p>E. يمكن إعطاء مطهرات أنفية لمنع الإنتان الثانوي</p> |
| <p>2 - كل البنى التشريحية التالية تمر من الشق الحجاجي العلوي ما عدا :</p> <p>A. العصب القحفي الثالث</p> <p>B. العصب الوجني</p> <p>C. العصب القحفي الرابع</p> <p>D. العصب العيني الحسي</p> <p>E. العصب القحفي السادس</p>                                                        | <p>7 - كل ما يلي صحيح عن الجحوظ الغدي في فرط نشاط الدرق ما عدا :</p> <p>A. يحدث عادة بين العقدتين الرابع والخامس</p> <p>B. يصيب الذكور أكثر من الإناث</p> <p>C. يكون عادة ثنائي الجانب</p> <p>D. يحدث فيه ضخامة في العضلات الخارجية للمقلة</p> <p>E. له شكلان سليم وخبيث</p>                                             |
| <p>3 - كل ما يلي عن أبعاد الحجاج عند البالغ صحيح ما عدا :</p> <p>A. الحجم 30 سم3</p> <p>B. الارتفاع 35 ملم</p> <p>C. العرض 40 ملم</p> <p>D. الطول 20 ملم</p> <p>E. المسافة من خلف المقلة إلى الثقب البصرية 18 ملم</p>                                                          | <p>8 - كل ما يلي صحيح عن الجحوظ الدرق السليم ما عدا :</p> <p>A. يترافق بانكماش الجفن أو الجفنين العلويين</p> <p>B. يترافق بانتفاخ الجفن أو الجفنين السفليين</p> <p>C. يترافق بامتلاء التلم تحت الجفن</p> <p>D. يترافق أحيانا بالشفع</p> <p>E. غير قابل للرد</p>                                                          |
| <p>4 - كل ما يلي صحيح عن الجحوظ ما عدا :</p> <p>A. هو بروز العين إلى الأمام</p> <p>B. يقاس الجحوظ بمقياس هرتل</p> <p>C. قد يكون وحيد الجانب</p> <p>D. قد يكون ثنائي الجانب</p> <p>E. يكون كاذب في حال نتج عن نزوف الحجاج</p>                                                   | <p>9 - كل ما يلي صحيح عن الجحوظ الدرق الخبيث ما عدا :</p> <p>A. جحوظ سريع الحدوث</p> <p>B. غير قابل للرد</p> <p>C. يستحيل الإغماض مما يؤدي لتقرح القرنية</p> <p>D. لا يترافق بشفع</p> <p>E. يصاب العصب البصري عند 5% من المرضى</p>                                                                                       |
| <p>5 - كل ما يلي عن الجحوظ الدموي صحيح ما عدا :</p> <p>A. هو عبارة عن نزف خلف الحجاج يدفع المقلة للأمام</p> <p>B. قد يكون ناجما عن الناعور</p> <p>C. قد يكون ناجما عن الجروح النافذة للعين</p> <p>D. قد يتجرثم النزف أو يتليف</p> <p>E. يعالج الجحوظ الدموي برشف النزف فقط</p> | <p>10 - كل ما يلي في معالجة الجحوظ الدرق صحيح ما عدا :</p> <p>A. يجب الاهتمام بحماية العين وبخاصة القرنية</p> <p>B. يعطى الثيوركسين والستيروئيدات القشرية بجرعات عالية</p> <p>C. يمكن استخدام السيكلوسبورين</p> <p>D. يمكن اللجوء للمعالجة الشعاعية</p> <p>E. يجب ألا تزيد فترة العلاج عن ثلاثة أسابيع</p>               |

| رقم السؤال  | 10                                   | 9           | 8         | 7                     | 6                         | 5                 | 4                                   | 3      | 2 | 1 |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|---|---|
| الجواب      | E                                    | D           | E         | B                     | A                         | E                 | E                                   | D      | B | D |
| تصحيح الخطأ | يفضل استمرار المعالجة نحو ثلاثة أشهر | يترافق بشفع | قابل للرد | الإناث أكثر من الذكور | الجدار الأنسي وليس الوحشي | يعالج بعلاج السبب | الجحوظ في هذه الحالة دموي وليس كاذب | 45 ملم |   |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>11 - كل ما يلي عن التهاب الهلل ما قبل الحاجز صحيح ما عدا :</b></p> <p>A. يكون عادة ثانويا لالتهاب الجفن</p> <p>B. لا يخترق الحاجز الحجاجي</p> <p>C. يترافق بألم</p> <p>D. يترافق بجحوظ</p> <p>E. حدة البصر طبيعية</p>                                                                                                          | <p><b>16 - كل ما يلي عن الورم الكاذب في الحجاج صحيح ما عدا :</b></p> <p>A. يظهر عادة بين سن 20 - 50 سنة من العمر</p> <p>B. يقلد التهاب هلل الحجاج</p> <p>C. غالبا ثنائي الجانب عند الكبار</p> <p>D. يترافق بجحوظ وتحدد في حركة المقلة</p> <p>E. يسبب إبطاء</p>                                                                      |
| <p><b>12 - كل يلي عن التهاب الهلل ما قبل الحاجز صحيح ما عدا :</b></p> <p>A. يصيب هذا الالتهاب الأطفال</p> <p>B. قد ينتج عن الشعيرة الحادة الشديدة</p> <p>C. قد ينتج عن لدغ الحشرات</p> <p>D. يحدث انتباج شديد بالأجفان</p> <p>E. لا يحتاج أي علاج</p>                                                                                | <p><b>17 - كل ما يلي عن الورم الكاذب في الحجاج صحيح ما عدا :</b></p> <p>A. ورم حجاجي التهابي غير نوعي</p> <p>B. يبدأ بألم مفاجئ</p> <p>C. يسبب وذمة في الأجفان</p> <p>D. لا يؤثر في حدة البصر</p> <p>E. قد يهدأ الالتهاب تلقائيا خلال بضعة أسابيع</p>                                                                               |
| <p><b>13 - كل ما يلي صحيح عن التهاب هلل الحجاج الجرثومي ما عدا :</b></p> <p>A. خمج في الأنسجة الرخوة خلف الحاجز الحجاجي</p> <p>B. يمكن أن يحدث كاختلاط لمداخلة جراحية على العين</p> <p>C. يترافق بجحوظ غالبا ثنائي الجانب</p> <p>D. يترافق بشفع</p> <p>E. يترافق مع حرارة موضعية</p>                                                 | <p><b>18 - كل ما يلي في معالجة الورم الكاذب في الحجاج صحيح ما عدا :</b></p> <p>A. تكفي المراقبة في الحالات الخفيفة</p> <p>B. الستيروئيدات فعالة بنسبة 100%</p> <p>C. يمكن إعطاء دواء سام للخلايا كالسيكلوفوسفاميد</p> <p>D. تقيد المعالجة الشعاعية بمقدار 25 Gy</p> <p>E. في حال عدم الاستجابة للعلاج يجب أخذ خزعة لنفي الأورام</p> |
| <p><b>14 - كل ما يلي صحيح عن التهاب هلل الحجاج الجرثومي ما عدا :</b></p> <p>A. حالة إسعافية توجب الاستشفاء</p> <p>B. قد ينتج عن خمج في الأسنان</p> <p>C. قد ينتج عن خمج في الجيوب الفكية</p> <p>D. قد يسبب التهاب سحايا</p> <p>E. لا تتأثر حدة البصر إطلاقا</p>                                                                      | <p><b>19 - كل مما يلي عن الجحوظ الوعائي صحيح ما عدا :</b></p> <p>A. جحوظ نابض</p> <p>B. قد ينجم عن دوالي الحجاج</p> <p>C. قد ينجم عن الورم الوعائي الحجاجي</p> <p>D. قد ينجم عن انسداد الشريان الشبكي المركزي</p> <p>E. قد ينجم عن ناسور بين الشريان السباتي والجيوب الكهفية</p>                                                    |
| <p><b>15 = كل ما يلي عن علاج التهاب هلل الحجاج صحيح ما عدا :</b></p> <p>A. العلاج بالصادات فموي وبجرعات عالية</p> <p>B. يعطى الأمبيسليلين للأطفال لتغطية النزلة الوافدة</p> <p>C. يعطى الميترونيدازول للكبار لتغطية اللاهوائيات</p> <p>D. يتابع العلاج لمدة أربعة أيام بعد زوال الحرارة</p> <p>E. قد يلجأ للجراحة في بعض الحالات</p> | <p><b>20 - كل مما يلي عن الجحوظ الوعائي صحيح ما عدا :</b></p> <p>A. يترافق مع الزرق بنسبة 70 %</p> <p>B. يسبب توسع الأوردة فوق الصلبة</p> <p>C. تسمع نفخة لدى اصغاء الحجاج والحفرة الصدى</p> <p>D. يحدث شلول في الأعصاب المحركة</p> <p>E. قد يترافق باعتلال القرنية الشللي</p>                                                      |

| رقم السؤال  | 20  | 19 | 18                    | 17                     | 16                         | 15                     | 14                                  | 13                | 12                      | 11              |
|-------------|-----|----|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| الجواب      | A   | D  | B                     | D                      | C                          | A                      | E                                   | C                 | E                       | D               |
| تصحيح الخطأ | 30% | -  | فعالة بنسبة 50 - 75 % | يحدث تدني في حدة البصر | نادرا ما يكون ثنائي الجانب | العلاج وريدي وليس فموي | تتأثر حدة البصر في المراحل المتقدمة | غالبا وحيد الجانب | يعالج بالصادات المناسبة | لا يترافق بجحوظ |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>21 - يتصف الجحوظ الورمي بكل ما يلي ما عدا :</b></p> <p>A. يكون صغيرا في البدء ثم يزداد تدريجيا</p> <p>B. غالبا ثنائي الجانب</p> <p>C. يتعلق اتجاه الجحوظ بمكان الورم</p> <p>D. غير قابل للرد</p> <p>E. يؤدي لشفع</p>         | <p><b>26 - كل ما يلي صحيح في متلازمة المخروط خلف المقلة ما عدا :</b></p> <p>A. تؤدي إلى جحوظ مستقيم ومحوري</p> <p>B. تترافق باضطرابات حركية</p> <p>C. لا تترافق بألم</p> <p>D. تسبب وذمة في حلزمة العصب البصري</p> <p>E. تسبب تدني في حدة الرؤية</p>                                            |
| <p><b>22 - ما يلي يفيد في تشخيص الجحوظ :</b></p> <p>A. قصة سريرية واضحة ودقيقة</p> <p>B. الأشعة السينية مع حقن الأوعية الظليلة</p> <p>C. التصوير الطبقي المحوري</p> <p>D. الرنين المغناطيسي</p> <p>E. كل ما سبق صحيح</p>           | <p><b>27 - كل ما يلي صحيح عن الخوص ما عدا :</b></p> <p>A. هو غزور المقلة</p> <p>B. غالبا ثنائي الجانب</p> <p>C. يمكن أن يكون ولادي</p> <p>D. يمكن أن يكون رضي</p> <p>E. يمكن أن يكون شللي</p>                                                                                                   |
| <p><b>23 - كل ما يلي من تظاهرات متلازمة الشق الحجاجي العلوي ما عدا:</b></p> <p>A. جحوظ</p> <p>B. إبطاق</p> <p>C. حول أنسي</p> <p>D. توسع حدقة</p> <p>E. تقرح قرنية</p>                                                             | <p><b>28 - يشاهد كسر BlowOut في :</b></p> <p>A. الجزء الخلفي الأنسي من الجدار السفلي للحجاج</p> <p>B. الجزء الأمامي من الجدار الوحشي للحجاج</p> <p>C. الجزء الوحشي من الجدار العلوي للحجاج</p> <p>D. الجزء العلوي من الجدار الأنسي للحجاج</p> <p>E. الجزء السفلي من الجدار الوحشي للحجاج</p>    |
| <p><b>24 - أول الأعصاب إصابة في متلازمة الشق الحجاجي العلوي هو :</b></p> <p>A. العصب البصري</p> <p>B. العصب القحفي الثالث</p> <p>C. العصب القحفي الرابع</p> <p>D. العصب القحفي السادس</p> <p>E. الشعبة العينية من العصب الخامس</p> | <p><b>29 - في تشريح الحجاج كل ما يلي صحيح ما عدا :</b></p> <p>A. جوف عظمي هرمي الشكل</p> <p>B. قاعدته في الأمام وذروته في الخلف</p> <p>C. يتألف من أربعة جدر</p> <p>D. الجدار الوحشي مربعي الشكل وبقيّة الجدر مثلثية</p> <p>E. يضم المقلة وملحقاتها</p>                                         |
| <p><b>25 - العصب الذي يصاب في متلازمة قاع الحجاج هو :</b></p> <p>A. العصب العيني</p> <p>B. العصب الوجهي</p> <p>C. العصب الفكي العلوي</p> <p>D. العصب الدمعي</p> <p>E. العصب المحرك العيني</p>                                      | <p><b>30 - كل ما يلي صحيح عن الثقبة البصرية ما عدا :</b></p> <p>A. تقع في ذروة الحجاج</p> <p>B. يمر منها العصب البصري</p> <p>C. يمر منها الشريان والوريد العيني</p> <p>D. يمر منها الأعصاب الودية الأتية من الضفيرة السباتية</p> <p>E. يقع الشق الحجاجي العلوي إلى الأنسي من الثقبة البصرية</p> |

| رقم السؤال  | 30         | 29                        | 28 | 27                | 26        | 25 | 24 | 23       | 22 | 21                |
|-------------|------------|---------------------------|----|-------------------|-----------|----|----|----------|----|-------------------|
| الجواب      | E          | D                         | A  | B                 | B         | C  | B  | C        | E  | B                 |
| تصحيح الخطأ | إلى الوحشي | الجدار الأنسي مربعي الشكل |    | غالبا وحيد الجانب | لا يترافق |    |    | حول وحشي |    | غالبا وحيد الجانب |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>31 – الجداران المتوازيان من جدر الحجاج التالية هما :</b></p> <p>A. الجدار الأنسيان</p> <p>B. الجداران العلويان</p> <p>C. الجداران الوحشيان</p> <p>D. الجداران السفليان</p> <p>E. لا يوجد جدر متوازية في الحجاج</p>                                                                       | <p><b>36 – الجيب الذي يجاوره الجدار العلوي للحجاج هو :</b></p> <p>A. الجيب الوتدي</p> <p>B. الجيب الجبهي</p> <p>C. الجيب الفكي</p> <p>D. الخلايا الغربالية</p> <p>E. لا يجاور أي من الجيوب</p>                                       |
| <p><b>32 – كل جدر الحجاج مثلثية الشكل ما عدا الجدار التالي فهو مربعي الشكل :</b></p> <p>A. الجدار الأنسي</p> <p>B. الجدار الوحشي</p> <p>C. الجدار العلوي</p> <p>D. الجدار السفلي</p> <p>E. لا يوجد جدار مربعي الشكل</p>                                                                        | <p><b>37 – ما يلي يمر من الميزابة تحت الحجاج :</b></p> <p>A. العصب الوجني والشریان العيني</p> <p>B. العصب الفكي والشریان تحت الحجاج</p> <p>C. العصب العيني والشریان تحت الحجاج</p> <p>D. العصب تحت الحجاج</p> <p>E. العصب البكري</p> |
| <p><b>33 – كل ما يلي صحيح عن الجدار العلوي للحجاج ما عدا :</b></p> <p>A. أي نقص فيه يسبب جحوظ نابض</p> <p>B. يفصل الحجاج عن الفص الجبهي للدماغ</p> <p>C. يتألف من العظم الجبهي في الأمام</p> <p>D. يتألف من الجناح الكبير للعظم الوتدي في الخلف</p> <p>E. يجاور هذا الجدار الجيب الجبهي</p>    | <p><b>38 – الجيب الذي يجاوره الجدار السفلي للحجاج هو :</b></p> <p>A. الجيب الوتدي</p> <p>B. الجيب الجبهي</p> <p>C. الجيب الفكي</p> <p>D. الخلايا الغربالية</p> <p>E. لا يجاور أي من الجيوب</p>                                       |
| <p><b>34 – تقع حفير الغدة الدرقية في :</b></p> <p>A. القسم الأمامي الوحشي من الجدار العلوي</p> <p>B. القسم الأمامي الأنسي من الجدار السفلي</p> <p>C. القسم الأمامي العلوي من الجدار الوحشي</p> <p>D. القسم الأمامي السفلي من الجدار الوحشي</p> <p>E. القسم الأمامي السفلي من الجدار الأنسي</p> | <p><b>39 – كل ما يلي صحيح عن الجدار الأنسي للحجاج ما عدا :</b></p> <p>A. جدار متقّب ورقيق جدا</p> <p>B. يتألف من ستة عظام</p> <p>C. يشارك العظم الفكي في تشكيله</p> <p>D. يجاور الخلايا الغربالية</p> <p>E. يجاور الجيب الوتدي</p>   |
| <p><b>35 – تقع حفيرة البكرة في الجدار العلوي للحجاج في قسمه :</b></p> <p>A. الأمامي الوحشي</p> <p>B. الأمامي الأنسي</p> <p>C. الخلفي الوحشي</p> <p>D. الخلفي الأنسي</p> <p>E. لا تقع في الجدار العلوي</p>                                                                                      | <p><b>40 – البنى التالية تمر من الشق الحجاجي السفلي :</b></p> <p>A. العصب الثالث والرابع</p> <p>B. العصب الخامس والسادس</p> <p>C. العصب ما تحت الحجاج والعصب الوجني</p> <p>D. العصب مثلث التوائم</p> <p>E. العصب الحجاجي السفلي</p>  |

| رقم السؤال  | 40 | 39         | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33            | 32 | 31 |
|-------------|----|------------|----|----|----|----|----|---------------|----|----|
| الجواب      | C  | B          | C  | B  | B  | B  | A  | D             | A  | A  |
| تصحيح الخطأ |    | أربعة عظام |    |    |    |    |    | الجناح الصغير |    |    |


|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>41 – ما يحمي العصب البصري من التمثط في حال الرضوض والجحوظ هو:</b></p> <p>A. غلافه المتين</p> <p>B. تعرج مساره بشكل حرف S</p> <p>C. ثخانته</p> <p>D. مساره القصير</p> <p>E. أربطته المثبنة له</p>                                              | <p><b>46 – ما يلي صحيح عن الجحوظ الورمي :</b></p> <p>A. غالبا ثنائي الجانب</p> <p>B. لا يتعلق اتجاه الجحوظ بمكان الورم</p> <p>C. غير قابل للرد</p> <p>D. لا يترافق بشفع</p> <p>E. لا يصاب العصب البصري</p>                                                                                      |
| <p><b>42 – العظام التالية تشكل الجدار الوحشي للحجاج :</b></p> <p>A. العظم الدمعي والعظم الفكي</p> <p>B. العظم الوجني والعظم الوتدي</p> <p>C. العظم الفكي والعظم الحنكي</p> <p>D. العظم الجبهي والعظم الأنفي</p> <p>E. العظم الوتدي والعظم الفكي</p> | <p><b>37 – كل الأعصاب التالية تصاب في متلازمة الشق الحجاجي العلوي ما عدا :</b></p> <p>A. العصب الثالث</p> <p>B. العصب الرابع</p> <p>C. الفرع العيني للعصب الخامس</p> <p>D. العصب السادس</p> <p>E. العصب السابع</p>                                                                              |
| <p><b>43 – يشاهد كبر كرتي العين عند :</b></p> <p>A. مرضى مد البصر الشديد</p> <p>B. مرضى حسر البصر الشديد</p> <p>C. مرضى ثلامة الجفن</p> <p>D. مرضى التهاب الملتحمة</p> <p>E. كل ما سبق خطأ</p>                                                      | <p><b>48 – في التهاب هلل الحجاج الجرثومي كل ما يلي صحيح ما عدا :</b></p> <p>A. أشد خطورة من التهاب الهلل ما قبل الحاجر</p> <p>B. حالة اسعافية توجب الاستشفاء</p> <p>C. في 50% من الحالات يحدث التهاب سحايا</p> <p>D. يجب تقييم العصب البصري كل 4 ساعات</p> <p>E. قد تستطب الجراحة في تدبيره</p> |
| <p><b>44 – ما يلي يستخدم في تدبير الجحوظ الدموي :</b></p> <p>A. علاج السبب</p> <p>B. رشف النزف</p> <p>C. إعطاء المرققات</p> <p>D. التداخل الجراحي أحيانا</p> <p>E. كل ما سبق صحيح</p>                                                               | <p><b>49 – واحد مما يلي من أورام الحجاج العصبية :</b></p> <p>A. الكيسة الجلدانية</p> <p>B. الكيسة الدموية</p> <p>C. الورم الدبقي في العصب البصري</p> <p>D. الوعاؤوم الدموي الشعري</p> <p>E. القيلة المخاطية</p>                                                                                 |
| <p><b>45 – كسر أحد جدر الحجاج التالية يسبب جحوظا غازيا :</b></p> <p>A. الجدار الوحشي</p> <p>B. الجدار الأنسي</p> <p>C. الجدار العلوي</p> <p>D. الجدار السفلي</p> <p>E. كل ما سبق خطأ</p>                                                            | <p><b>50 – الفئة التالية يمكن أن نشاهد عندها خوصا ثنائي الجانب :</b></p> <p>A. الأطفال تحت 15 سنة</p> <p>B. المسنين</p> <p>C. مرضى الإيدز</p> <p>D. مرضى الحول</p> <p>E. مرضى حسر البصر الشديد</p>                                                                                              |

| رقم السؤال  | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| الجواب      | B  | C  | C  | E  | C  | B  | E  | B  | B  | B  |
| تصحيح الخطأ |    |    | 5% |    |    |    |    |    |    |    |

# رضوض العين وجروحها

(50) سؤال

لكل سؤال إجابة واحدة فقط



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1- عند معاينة مريض مصاب برض على العين يجب إجراء ما يلي <u>عدا</u>:</b></p> <p>A. أخذ القصة والموجودات السريرية بشكل دقيق.</p> <p>B. قياس القدرة البصرية للعين المرضوضة والسليمة.</p> <p>C. عدم إجراء فحص العين بالقوة لمريض غير متعاون.</p> <p>D. عدم إجراء صور شعاعية للعين أياً كان نوع الأذية.</p> <p>E. عدم استعمال أي نوع من القطرات العينية غير المعقمة.</p> | <p><b>6- تكون الصورة السريرية في رضوض العين الكليّة: (<u>اختر</u> <u>الخاطئة</u>)</b></p> <p>A. يكون الببت الأمامي رائق.</p> <p>B. التهاب القرنية والجسم الهدبي.</p> <p>C. تقبض رضي في الحدقة مترافق مع تشنج مطابقة.</p> <p>D. قد تظهر نزوف في المشيمية.</p> <p>E. قد يحدث انفكاك لجذر القرنية.</p>                                                                                        |
| <p><b>2- تعتبر تسحجات القرنية من أذيات العين:</b></p> <p>A. اللانافذة.</p> <p>B. النافذة دون تفتق أنسجة العين.</p> <p>C. النافذة مع تفتق أنسجة العين.</p> <p>D. رض بعوامل فيزيائية.</p> <p>E. لا شيء مما سبق.</p>                                                                                                                                                        | <p><b>7- تكون الصورة السريرية للقرنية في رضوض العين الكليّة: (<u>اختر</u> <u>الخاطئة</u>)</b></p> <p>A. سحجات.</p> <p>B. كثافات عميقة.</p> <p>C. قد يحدث وذمة في اللحمية.</p> <p>D. تمزق غشاء ديسمييه.</p> <p>E. تعالج بإعطاء الصادات والستيروئيدات جهازياً.</p>                                                                                                                           |
| <p><b>3-تعتبر الرضوض الكليّة من أذيات العين:</b></p> <p>A. اللانافذة.</p> <p>B. النافذة دون تفتق أنسجة العين.</p> <p>C. النافذة مع تفتق أنسجة العين.</p> <p>D. رض بعوامل فيزيائية.</p> <p>E. لا شيء مما سبق.</p>                                                                                                                                                         | <p><b>8- عند تشكل الساد الرضي:</b></p> <p>A. يمر الخلط المائي إلى ألياف الجسم البلوري محدثاً كثافات بشكل ورقة.</p> <p>B. يمر الخلط المائي إلى ألياف الجسم البلوري محدثاً كثافات بشكل وردة.</p> <p>C. يمر الخلط الزجاجي إلى ألياف الجسم البلوري محدثاً كثافات بشكل ورقة.</p> <p>D. يمر الخلط الزجاجي إلى ألياف الجسم البلوري محدثاً كثافات بشكل وردة.</p> <p>E. لا شيء مما سبق.</p>         |
| <p><b>4- تقسم الحروق العينية إلى:</b></p> <p>A. فيزيائية وكيميائية.</p> <p>B. فيزيائية وحرارية.</p> <p>C. كيميائية وحرارية.</p> <p>D. فيزيائية وكيميائية وحرارية.</p> <p>E. لا شيء مما سبق.</p>                                                                                                                                                                          | <p><b>9- تكون الصورة السريرية في رضوض العين الكليّة: (<u>اختر</u> <u>الخاطئة</u>)</b></p> <p>A. قد يشاهد تميّع أو كثافات صباغية أو نزف في الخلط الزجاجي.</p> <p>B. قد تظهر نزوف أو تمزقات في المشيمية.</p> <p>C. قد يظهر الزرق الرضي بسبب التضيق الوعائي.</p> <p>D. قد تترافق الشبكية بنزوف أو وذمات أو استحالات.</p> <p>E. قد تترافق الشبكية بتمزقات أو انفكاك عند الدائرة المنشارية.</p> |
| <p><b>5- يصنف الرض بالتيار الكهربائي من أذيات العين:</b></p> <p>A. اللانافذة.</p> <p>B. النافذة دون تفتق أنسجة العين.</p> <p>C. النافذة مع تفتق أنسجة العين.</p> <p>D. رض بعوامل فيزيائية.</p> <p>E. لا شيء مما سبق.</p>                                                                                                                                                 | <p><b>10- نطلق مصطلح وذمة برلين على ارتجاج:</b></p> <p>A. الصلبة.</p> <p>B. المشيمية.</p> <p>C. الشبكية.</p> <p>D. الخلط المائي.</p> <p>E. الخلط الزجاجي.</p>                                                                                                                                                                                                                              |

|             |   |   |   |   |   |     |          |   |            |    |
|-------------|---|---|---|---|---|-----|----------|---|------------|----|
| رقم السؤال  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   | 7        | 8 | 9          | 10 |
| الجواب      | D | A | A | C | D | A   | E        | B | C          | C  |
| تصحيح الخطأ |   |   |   |   |   | عكر | موضعيّاً |   | توسع وعائي |    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>11- تكون الصورة السريرية للأجفان والملتحمة في رضوض العين الكليّة: (اختر الصحيحة)</b></p> <p>A. نلاحظ كدمة أجفان.</p> <p>B. نلاحظ نزف تحت الملتحمة.</p> <p>C. تعطى الصادات موضعياً وجهازياً خوفاً من الإنتان.</p> <p>D. تفيد الكمادات الباردة في التخفيف من الوذمة إذا طبقت باكراً.</p> <p>E. كل ما سبق صحيح.</p>   | <p><b>16- في انخلاع الجسم البلوري الجزئي التابع للرضوض الكليّة:</b></p> <p>A. يحدث بسبب تمزق بعض الأربطة المعلقة للجسم البلوري وعلامته المميزة هي شفّع بعين واحدة.</p> <p>B. يحدث بسبب تمزق كل الأربطة المعلقة للجسم البلوري وعلامته المميزة هي شفّع بعين واحدة.</p> <p>C. يحدث بسبب تمزق بعض الأربطة المعلقة للجسم البلوري وعلامته المميزة هي شفّع بكلتا العينتين.</p> <p>D. يحدث بسبب تمزق كل الأربطة المعلقة للجسم البلوري وعلامته المميزة هي شفّع بكلتا العينتين.</p> <p>E. لا شيء مما سبق.</p> |
| <p><b>12- تكون الصورة السريرية للقرنية والجسم الهدبي في رضوض العين الكليّة: (اختر الخاطئة)</b></p> <p>A. قد يحدث التهاب في القرنية والجسم الهدبي.</p> <p>B. تعالج بمضيقات الحدقة.</p> <p>C. تجوز المعالجة بالستيروئيدات موضعياً.</p> <p>D. قد يحدث انفكاك جذر القرنية.</p> <p>E. قد يحدث انقلاب قرنية أمامي أو خلفي.</p> | <p><b>17- تكون الصورة السريرية لمنطقة الحجاج في رضوض العين الكليّة: (اختر الصحيحة)</b></p> <p>A. جحوظ بسبب نزف في الحجاج.</p> <p>B. غوور بسبب نزف في الحجاج.</p> <p>C. جحوظ غير نابض في حال تشكل ناسور سباتي كهفي.</p> <p>D. بقاء حركات العين طبيعية في حال تشكل ناسور سباتي كهفي.</p> <p>E. لا شيء مما سبق.</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>13- انفكاك جذر القرنية في رضوض العين الكليّة: (اختر الخاطئة)</b></p> <p>A. يبقى شكل الحدقة طبيعياً رغم تمزق معصرة الحدقة.</p> <p>B. تظهر كثافة خفيفة في الجسم البلوري.</p> <p>C. رؤية مزدوجة في عين واحدة.</p> <p>D. يحدث انقلاب قرنية أمامي أو خلفي.</p> <p>E. تصبح الحدقة غير دائرية تماماً.</p>                 | <p><b>18- تكون الصورة السريرية في رضوض العين الكليّة: (اختر الصحيحة)</b></p> <p>A. قد يحدث في العصب البصري وذمة مع نزوف.</p> <p>B. يعالج تمزق المقلة كما في جروح العين النافذة.</p> <p>C. قد يحدث انخلاع الجسم البلوري بشكل جزئي.</p> <p>D. قد يحدث انخلاع الجسم البلوري بشكل تام.</p> <p>E. كل ما سبق صحيح.</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>14- انطباع صباغ القرنية على المحفظة الأمامية للجسم البلوري أثناء الرض يسمى:</b></p> <p>A. حلقة لاندولت.</p> <p>B. حلقة كايزر- فلايشر.</p> <p>C. حلقة فوسيسوس.</p> <p>D. حلقة سومرينغ.</p> <p>E. لا شيء مما سبق.</p>                                                                                                | <p><b>19- في جروح العين النافذة: (اختر الخاطئة)</b></p> <p>A. تحدث عند إصابة العين بأدوات حادة.</p> <p>B. تخرب هذه الأجسام أنسجة العين بشكل غير مباشر.</p> <p>C. قد تسبب التهاب باطن العين القيحي.</p> <p>D. قد يحدث التهاب العين الودي في العين الأخرى (السليمة).</p> <p>E. قد تحدث عند إصابة العين بالأجسام الأجنبية المتطايرة.</p>                                                                                                                                                               |
| <p><b>15- وذمة برلين:</b></p> <p>A. وذمة منتشرة في القطب الأمامي للعين.</p> <p>B. وذمة منتشرة في القطب الخلفي للعين.</p> <p>C. وذمة منتشرة في كل من القطب الأمامي والخلفي للعين.</p> <p>D. وذمة محددة لا تنتشر في أي من القطبين.</p> <p>E. لا شيء مما سبق.</p>                                                           | <p><b>20- في جروح الأجفان: (اختر الخاطئة)</b></p> <p>A. تصنف على أنها من جروح العين النافذة.</p> <p>B. تخاط جروح الأجفان الموازية لحافتها خياطة بسيطة.</p> <p>C. تخاط الجروح العمودية على حافة الجفن على طبقات.</p> <p>D. يجب الانتباه عند توضع الجرح في المآق الإنسي إلى سلامة القنويات الدمعية وبخاصة السفلية.</p> <p>E. نادراً ما يترافق جرح الجفن بجرح في المقلة.</p>                                                                                                                           |

| رقم السؤال  | 11 | 12     | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19    | 20     |
|-------------|----|--------|----|----|----|----|----|----|-------|--------|
| الجواب      | E  | B      | A  | C  | B  | A  | A  | E  | B     | E      |
| تصحيح الخطأ |    | موسعات |    |    |    |    |    |    | مباشر | كثيراً |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>21- في جروح الملتحمة: (اختر الصحيحة)</b><br>A. تترافق عادة بنزف فوق الملتحمة.<br>B. تترافق عادة بنزف تحت الملتحمة.<br>C. إذا كان جرح الملتحمة صغيراً وجبت خياطته.<br>D. إذا كان جرح الملتحمة كبيراً ترك وشأته.<br>E. يفضل عدم إعطاء الصادات. | <b>26- إذا ترافق بتفتق قزحية تعاد القزحية لمكانها أو يقطع الجزء المتفتق:</b><br>A. جروح الجسم البلوري.<br>B. جروح الصلبة.<br>C. جروح القرنية.<br>D. جروح الملتحمة.<br>E. لا شيء مما سبق.                                                                                                                                                                       |
| <b>22- قد تخفي جرحاً صليباً:</b><br>A. جروح الجسم البلوري.<br>B. جروح الصلبة.<br>C. جروح القرنية.<br>D. جروح الملتحمة.<br>E. لا شيء مما سبق.                                                                                                    | <b>27- في جروح الصلبة: (اختر الصحيحة)</b><br>A. تعتبر من جروح العين النافذة.<br>B. تخاط جروح الصلبة بعد كشفها بشكل جزئي.<br>C. جروح الصلبة تترك دون خياطة.<br>D. في حال ترافقت بتفتق قزحية نقوم برد القزحية ثم الخياطة.<br>E. في حال ترافقت بتفتق قزحية نقوم نقوم بقطع الأنسجة المتفتقة ثم يترك الجرح دون خياطة.                                               |
| <b>23- جروح القرنية: (اختر الصحيحة)</b><br>A. تصنف على أنها من جروح العين النافذة.<br>B. تتراوح من صغيرة إلى ممتدة.<br>C. تترك الصغيرة دون خياطة.<br>D. في حال كان الجرح كبيراً وجبت خياطته.<br>E. كل ما سبق صحيح.                              | <b>28- إذا ترافق بتفتق تقطع الأنسجة المتفتقة:</b><br>A. جروح الجسم البلوري.<br>B. جروح الصلبة.<br>C. جروح القرنية.<br>D. جروح الملتحمة.<br>E. لا شيء مما سبق.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>24- تترك الصغيرة منها (1-2) ملم دون خياطة إذا كان البيت الأمامي متشكلاً:</b><br>A. جروح الجسم البلوري.<br>B. جروح الصلبة.<br>C. جروح القرنية.<br>D. جروح الملتحمة.<br>E. لا شيء مما سبق.                                                     | <b>29- تخاط بعد كشفها بشكل كامل:</b><br>A. جروح الجسم البلوري.<br>B. جروح الصلبة.<br>C. جروح القرنية.<br>D. جروح الملتحمة.<br>E. لا شيء مما سبق.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>25- يخط بخيوط مجهرية:</b><br>A. جروح الجسم البلوري.<br>B. جروح الصلبة.<br>C. جروح القرنية.<br>D. جروح الملتحمة.<br>E. لا شيء مما سبق.                                                                                                        | <b>30- في جروح الجسم البلوري: (اختر الخاطئة)</b><br>A. تعتبر من جروح العين النافذة.<br>B. تؤدي جروح الجسم البلوري إلى تشكل الساد الرضي.<br>C. تسبب الجروح النافذة الواسعة تهتكاً في القسم الخلفي من العين.<br>D. الأهم في جميع الجروح النافذة هو السرعة في تشخيصها وإغلاقها جراحياً.<br>E. تعطى الصادات موضعياً وبالطريق العام وحقق تحت الملتحمة خشية الإنتان. |

|             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|
| رقم السؤال  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30      |
| الجواب      | B  | D  | E  | C  | C  | C  | A  | B  | B  | C       |
| تصحيح الخطأ |    |    |    |    |    |    |    |    |    | الأمامي |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>31- يؤدي لتشكل الساد الرضي:</b></p> <p>A. جروح الجسم البلوري.<br/> B. جروح الصلبة.<br/> C. جروح القرنية.<br/> D. جروح الملتحمة.<br/> E. لا شيء مما سبق.</p>                                                                                                                                                         | <p><b>36- الاختلالات المتأخرة لالتهاب العين الودي: (اختر الخاطئة)</b></p> <p>A. الساد.<br/> B. الزرق الثانوي.<br/> C. ارتفاع ضغط العين.<br/> D. ضمور العين.<br/> E. انعدام حس الضياء.</p>                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>32- تسبب أحياناً زرقاً أو التهاب عنبة ثانوي:</b></p> <p>A. جروح الجسم البلوري.<br/> B. جروح الصلبة.<br/> C. جروح القرنية.<br/> D. جروح الملتحمة.<br/> E. لا شيء مما سبق.</p>                                                                                                                                        | <p><b>37- في الوقاية من التهاب العين الودي يكون حد الانتظار:</b></p> <p>A. 4 أيام.<br/> B. 14 يوم.<br/> C. 4 أسابيع.<br/> D. 14 أسبوع.<br/> E. لا شيء مما سبق.</p>                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>33- في جروح الجسم البلوري: (اختر الخاطئة)</b></p> <p>A. يؤدي لتشكل الساد الرضي.<br/> B. قد يسبب زرق أو التهاب عنبة ثانوي.<br/> C. يعالج بخياطته بشكل كامل.<br/> D. قد تصحح الحالة بعدسة لاصقة.<br/> E. قد تصحح الحالة بزراعة عدسة داخل العين.</p>                                                                   | <p><b>38- في الحروق الكيميائية:</b></p> <p>A. تصيب المواد الحامضية الطبقات السطحية وتنفذ المواد القلوية إلى البيت الأمامي.<br/> B. تصيب المواد القلوية الطبقات السطحية وتنفذ المواد الحامضية إلى البيت الأمامي.<br/> C. ينفذ كل من المواد الحامضية والقلوية للبيت الأمامي.<br/> D. تصيب كل من المواد الحامضية والقلوية الطبقة السطحية فقط.<br/> E. لا شيء مما سبق.</p>            |
| <p><b>34- في التهاب العين الودي: (اختر الخاطئة)</b></p> <p>A. قد تصاب العين الشديدة بالتهاب عنبة شديد.<br/> B. التهاب العين الودي مرض مناعي ذاتي.<br/> C. تلعب خلايا العنبة دور المستضدات.<br/> D. تنتقل الأضداد المتولدة مع الجريان الدموي إلى العين السليمة.<br/> E. ينتج عن التفاعل المناعي التهاب عنبة غير حبيبي.</p> | <p><b>39- في الحروق الكيميائية:</b></p> <p>A. الحوامض ذات إنذار أسوأ من القلويات.<br/> B. القلويات ذات إنذار أسوأ من الحوامض.<br/> C. للحوامض والقلويات نفس الإنذار.<br/> D. لا توجد دراسات كافية بعد.<br/> E. لا شيء مما سبق.</p>                                                                                                                                                |
| <p><b>35- في الصورة السريرية لالتهاب العنبة الودي: (اختر الخاطئة)</b></p> <p>A. تبقى العين المرضوضة محتقنة.<br/> B. تظهر الالتصاقات الأمامية.<br/> C. انخفاض ضغط العين.<br/> D. كثافات في الجسم الزجاجي.<br/> E. علامات التهاب قزحية وجسم هدي مزم.</p>                                                                    | <p><b>40- مراحل الحروق الكيميائية: (اختر الخاطئة)</b></p> <p>A. يحدث في مرحلة الاحمرار والالتهاب البسيط احتقان في الملتحمة.<br/> B. يحدث في مرحلة النتج قسأ ملتحمة.<br/> C. يحدث في مرحلة النتج مناطق نقص تروية في الملتحمة.<br/> D. يحدث في مرحلة النتج كثافات في القرنية وازدياد حساسيتها.<br/> E. يحدث في مرحلة نقص التروية الشامل والتنخر تغيرات بحيث تصبح القرنية بيضاء.</p> |

| رقم السؤال  | 31 | 32 | 33                                | 34    | 35      | 36     | 37 | 38 | 39 | 40    |
|-------------|----|----|-----------------------------------|-------|---------|--------|----|----|----|-------|
| الجواب      | A  | A  | C                                 | E     | B       | C      | B  | A  | B  | D     |
| تصحيح الخطأ |    |    | غسل الكتل البلورية واستئصال الساد | حبيبي | الخلفية | انخفاض |    |    |    | نقصان |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>41- من اختلاطات الحروق الكيميائية: (اختر الخاطئة)</b></p> <p>A. كثافات قرنية غير موعاة.</p> <p>B. زرق ثانوي.</p> <p>C. ساد.</p> <p>D. ضمور عين.</p> <p>E. التصاق الجفن بالمقلة.</p>                                                                                                                 | <p><b>46- من عقايل الرض بالأشعة السينية حدوث الساد الذي يتوضع بشكل قرص:</b></p> <p>A. أمام المحفظة الأمامية للجسم البلوري.</p> <p>B. أمام المحفظة الخلفية للجسم البلوري.</p> <p>C. خلف المحفظة الأمامية للجسم البلوري.</p> <p>D. خلف المحفظة الخلفية للجسم البلوري.</p> <p>E. لا شيء مما سبق.</p>                                                                                  |
| <p><b>42- لعلاج الحروق الكيميائية: (اختر الخاطئة)</b></p> <p>A. غسل العين بالماء بغزارة لوقت طويل.</p> <p>B. النقل إلى طبيب مختص.</p> <p>C. متابعة غسل العين بالمصل الفيزيولوجي.</p> <p>D. يقوم الطبيب المختص بتضييق الحدقة.</p> <p>E. إعطاء الصادات موضعياً على شكل قطرات ومراهم.</p>                    | <p><b>47- لدى مقارنة الساد المسبب بالأشعة تحت الحمراء مع الساد المسبب بالأشعة السينية:</b></p> <p>A. كلا النوعين أحادي الجانب.</p> <p>B. كلا النوعين ثنائي الجانب.</p> <p>C. الساد بالأشعة تحت الحمراء أحادي الجانب أما الساد بالأشعة السينية ثنائي الجانب.</p> <p>D. الساد بالأشعة السينية أحادي الجانب أما الساد بالأشعة تحت الحمراء ثنائي الجانب.</p> <p>E. لا شيء مما سبق.</p> |
| <p><b>43- بمقارنة الإنذار لكل من الحروق الكيميائية والحروق الحرارية:</b></p> <p>A. الحروق الكيميائية أفضل إنذاراً من الحروق الحرارية.</p> <p>B. الحروق الحرارية أفضل إنذاراً من الحروق الكيميائية.</p> <p>C. لكلا النوعين الإنذار نفسه.</p> <p>D. لا توجد دراسات كافية بعد.</p> <p>E. لا شيء مما سبق.</p> | <p><b>48- في الرض الضوئي: (اختر الخاطئة)</b></p> <p>A. يحدث اعتلال شبكية وصفي.</p> <p>B. يشاهد بعد الإشعاعات الذرية أو بعد النظر المديد وبدون حماية لأشعة الشمس أثناء الكسوف.</p> <p>C. تتركز الإصابة في القطب الخلفي.</p> <p>D. يشاهد احتقان في منطقة البقعة الصفراء.</p> <p>E. يشاهد وذمة رمادية حولها.</p>                                                                      |
| <p><b>44- إن الرض بالأشعة فوق البنفسجية يسبب: (اختر الصحيحة)</b></p> <p>A. التهاب القرنية الضوئي.</p> <p>B. التهاب القزحية الضوئي.</p> <p>C. التهاب الصلبة الضوئي.</p> <p>D. التهاب المشيمية الضوئي.</p> <p>E. التهاب الشبكية الضوئي.</p>                                                                 | <p><b>49- في الإصابات الشديدة للرض الضوئي قد نشاهد ثقبية في: (اختر الصحيحة)</b></p> <p>A. القرنية.</p> <p>B. الجسم البلوري.</p> <p>C. البقعة الصفراء.</p> <p>D. النقطة العمياء.</p> <p>E. كل ما سبق صحيح.</p>                                                                                                                                                                      |
| <p><b>45- المسبب الأساسي للساد الحراري هو:</b></p> <p>A. الرض بالأشعة فوق البنفسجية.</p> <p>B. الرض بالأشعة تحت الحمراء.</p> <p>C. الرض بالأشعة السينية.</p> <p>D. الرض الضوئي.</p> <p>E. الرض بالتيار الكهربائي.</p>                                                                                     | <p><b>50- في الرض بالتيار الكهربائي: (اختر الخاطئة)</b></p> <p>A. ينجم عن صدمة كهربائية بتيار عالي التوتر.</p> <p>B. يسبب ساداً ثنائي الجانب غالباً.</p> <p>C. يتطور بسرعة (أحياناً شهر).</p> <p>D. تشاهد بعض النزوف في الشبكية.</p> <p>E. لا شيء مما سبق.</p>                                                                                                                     |

| رقم السؤال  | 41    | 42    | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48    | 49 | 50 |
|-------------|-------|-------|----|----|----|----|----|-------|----|----|
| الجواب      | A     | D     | B  | A  | B  | B  | B  | E     | C  | E  |
| تصحيح الخطأ | موعاة | توسيع |    |    |    |    |    | بيضاء |    |    |

# أدوية العين

(14) سؤال

لكل سؤال إجابة واحدة فقط



|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) كل ما يلي حول الأتروبين صحيح ما عدا:<br>A. يستعمل لعلاج التهاب القرنية والجسم الهدبي.<br>B. الغمش مضاد استطباب للأتروبين.<br>C. من الأدوية الحالة لنظيرة الودي.<br>D. يستعمل لفحص خلل الانكسار عند الأطفال.<br>E. موسع للحدقة. | 6) من استطبابات الستيروئيدات العينية:<br>A. التهاب الملتحمة الأليرجائي.<br>B. قرحات القرنية الهامشية.<br>C. التهاب القرنية الأمامي الحاد.<br>D. التهاب السبيل العنبي المتوسط والخلفي.<br>E. جميع ما سبق صحيح |
| 2) يفيد الأتروبين في التهابات العنبة لما يلي عدا:<br>A. يزيد الاحتقان الدموي.<br>B. يرخي القرنية والجسم الهدبي.<br>C. يخفف الألم.<br>D. يمنع حدوث الالتصاقات الخلفية.<br>E. يحرر الالتصاقات حديثة التشكل                          | 7) من استطبابات الستيروئيدات العينية:<br>A. التهاب العين الودي.<br>B. بعض حالات التهاب العصب البصري.<br>C. بعد العمليات الجراحية العينية مثل رأب القرنية.<br>D. التهاب الصلبة.<br>E. جميع ما سبق صحيح        |
| 3) إجابة واحدة صحيحة حول الأتروبين:<br>A. من الأدوية الحالة للودي.<br>B. يقبض الحدقة.<br>C. يعتبر ركن ثانوي في علاج التهابات العنبة.<br>D. شال للمطابقة.<br>E. جميع ما سبق صحيح.                                                  | 8) من محاذير استخدام الستيروئيدات الموضعية:<br>A. تشكل الساد.<br>B. الجحوظ.<br>C. ارتفاع ضغط المقلة.<br>D. شلل العصب السادس.<br>E. جميع ما سبق صحيح.                                                         |
| 4) يتصف الأتروبين بأنه:<br>A. موسع للحدقة.<br>B. يشل الجسم الهدبي.<br>C. يمكن أن يؤدي استعماله لاحمرار الجلد.<br>D. يمكن أن يؤدي استعماله لترفع حروري.<br>E. جميع ما سبق صحيح.                                                    | 9) من محاذير استخدام الستيروئيدات الموضعية:<br>A. إثارة التهاب القرنية الخلالي.<br>B. توسع الحدقة وانسدال جفن مؤقت.<br>C. الجحوظ.<br>D. تشكل الساد.<br>E. جميع ما سبق صحيح .                                 |
| 5) من استطبابات الستيروئيدات العينية ما يلي عدا:<br>A. جميع حالات التهاب العصب البصري.<br>B. التهاب الصلبة وما فوق الصلبة.<br>C. الحلا المنطقي.<br>D. التهابات القرنية الخلالية.<br>E. التهاب حواف الأجفان.                       | 10) من مضادات استطباب الكورتيكوستيروئيدات:<br>A. التهاب القرنية النفاطي.<br>B. التهاب القرنية الخلالي الزهري.<br>C. التهاب حليلة العصب البصري<br>D. القرحة القرنية العقبولية.<br>E. جميع ما سبق صحيح         |

|             |   |               |   |   |     |   |   |   |   |    |
|-------------|---|---------------|---|---|-----|---|---|---|---|----|
| رقم السؤال  | 1 | 2             | 3 | 4 | 5   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| الجواب      | B | A             | D | E | A   | E | E | E | E | D  |
| تصحيح الخطأ |   | يخفف الاحتقان |   |   | بعض |   |   |   |   |    |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>11) من الآثار الجانبية لقطرة التيمولول</p> <p>A. تصبغ الملتحمة</p> <p>B. تباطؤ القلب</p> <p>C. تشنج قصبي</p> <p>D. B+C</p> <p>E. تشنج المطابقة</p>                              | <p>13) يتصف الأدرينالين بأنه:</p> <p>A. من شادات بيتا الأدرينرجية.</p> <p>B. يستعمل في معالجة الزرق البدئي مفتوح الزاوية.</p> <p>C. موسع للحدقة.</p> <p>D. قد يثير هجمة زرق حادة.</p> <p>E. جميع ما سبق صحيح.</p> |
| <p>12) يتصف التيمولول بأنه:</p> <p>A. من مقلدات بيتا.</p> <p>B. من تأثيراته تسرع القلب.</p> <p>C. من حاصرات بيتا.</p> <p>D. يزيد الضغط داخل المقلة.</p> <p>E. جميع ما سبق صحيح</p> | <p>14) يسبب البيلوكاربين ما يلي عدا:</p> <p>A. تشنج في المطابقة.</p> <p>B. خدر أصابع.</p> <p>C. كيسات قزحية.</p> <p>D. غشاوة ليلية.</p> <p>E. تعرق .</p>                                                          |

|             |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|
| رقم السؤال  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| الجواب      | D  | C  | E  | B  |
| تصحيح الخطأ |    |    |    |    |

### إعداد

حسين محمد خير الحسن    أحمد فؤاد اسماعيل    محمد فؤاد اسماعيل

أمانى جمعة الجريس    إيمان محمود المحمود